

21/10/2020

$$286 \quad \sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}} \cdot \sqrt{10}$$

$$287 \quad \sqrt[3]{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} : \sqrt{\frac{1}{6}}$$

$$288 \quad \left( \sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} \right) : \sqrt[6]{\frac{1}{36}}$$

$$\begin{aligned} 286 \quad & \sqrt[3]{\frac{1}{2} - \frac{1}{5}} \cdot \sqrt{10} = \sqrt[3]{\frac{5-2}{10}} \cdot \sqrt{10} = \sqrt[3]{\frac{3}{10}} \cdot \sqrt{10} = \\ & = \sqrt[6]{\frac{3^2}{10^2}} \cdot \sqrt[6]{10^3} = \sqrt[6]{\frac{3^2}{10^2} \cdot 10^3} = \sqrt[6]{9 \cdot 10} = \sqrt[6]{90} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 287 \quad & \sqrt[3]{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} : \sqrt{\frac{1}{6}} = \sqrt[3]{\frac{4-3}{6}} : \sqrt{\frac{1}{6}} = \sqrt[3]{\frac{1}{6}} : \sqrt{\frac{1}{6}} = \\ & = \sqrt[6]{\frac{1}{6^2}} : \sqrt[6]{\frac{1}{6^3}} = \sqrt[6]{\frac{1}{6^2} : \frac{1}{6^3}} = \sqrt[6]{\frac{1}{6^2} \cdot 6^3} = \sqrt[6]{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 288 \quad & \left( \sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}} \right) : \sqrt[6]{\frac{1}{36}} = \\ & = \sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{\frac{4-3}{6}} : \sqrt[6]{\frac{1}{6^2}} = \sqrt{6} \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{6}} : \sqrt[6]{\frac{1}{6^2}} = \\ & = \sqrt[6]{6^3 \cdot \frac{1}{6^2} : \frac{1}{6^2}} = \sqrt[6]{6^3} = \sqrt{6} \end{aligned}$$

## POTENZE DI RADICI

$$322 \quad (\sqrt[4]{3})^3 = \sqrt[4]{3^3} = \sqrt[4]{27}$$

$$323 \quad (\sqrt[3]{2})^2 = \sqrt[3]{2^2} = \sqrt[3]{4}$$

$$324 \quad (\sqrt[5]{9})^2 = \sqrt[5]{9^2} = \sqrt[5]{81}$$

### ALTRI ESEMPI

$$(\sqrt{2})^2 = 2 \quad \text{infatti} \quad (\sqrt{2})^2 = \sqrt{2^2} = \sqrt{4} = 2$$

$$(\sqrt[3]{7})^2 = \sqrt[3]{7^2} = \sqrt[3]{49}$$

$$\hookrightarrow (\sqrt[3]{7})^2 = \sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7} = \sqrt[3]{7 \cdot 7} = \sqrt[3]{7^2}$$

## RADICI DI UN RADICALE

$$332 \quad \sqrt[3]{\sqrt{3}} = \sqrt[6]{3} \rightarrow \text{infatti} \quad (\sqrt[3]{\sqrt{3}})^6 = \sqrt[3]{(\sqrt{3})^6} =$$

$$333 \quad \sqrt{\sqrt{2}} = \sqrt[4]{2} \quad = (\sqrt{3})^2 = 3$$

$$334 \quad \sqrt[3]{\sqrt{2}} = \sqrt[6]{2}$$

$$335 \quad \sqrt{\sqrt[3]{3}} = \sqrt[12]{3}$$

$\Downarrow$   
quindi  
 $\sqrt[3]{\sqrt{3}}$  elevato  
a 6 dà 3,  
cioè  $\sqrt[3]{\sqrt{3}} = \sqrt[6]{3}$

**TEOREMA 5 | Alcune operazioni tra radicali**

Nell'ipotesi che siano verificate le condizioni di esistenza di tutti i radicali al primo membro, valgono le seguenti proprietà:

- a.  $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$  con  $n \in \mathbb{N} - \{0\}$
- b.  $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$  con  $n \in \mathbb{N} - \{0\}$
- c.  $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$  con  $n, m \in \mathbb{N} - \{0\}$
- d.  $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}}$  con  $n, m \in \mathbb{N} - \{0\}$

## TRASPORTO SOTTO IL SEGNO DI RADICE

**346**  $2\sqrt{2};$

$-3\sqrt{3}$

$[\sqrt{8}; -\sqrt{27}]$

$$2\sqrt{2} = \sqrt{2^2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2^2 \cdot 2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$$

OBIETTIVO = scrivere

$2\sqrt{2}$  come radicale  
del tipo  $\sqrt{a}$

$$5\sqrt{3} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{5^2 \cdot 3} = \sqrt{75}$$

questo paragrafo lo saltiamo

$$-3\sqrt{3} = -\sqrt{3^2 \cdot 3} = -\sqrt{27}$$

IN GENERALE

$$a\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a^n \cdot b}$$

$a, b > 0$

347  $3\sqrt{2}$ ;

$-2\sqrt{3}$

$[\sqrt{18}; -\sqrt{12}]$

348  $\frac{1}{2}\sqrt{8}$ ;

$-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}}$

$[\sqrt{2}; -\sqrt{\frac{2}{3}}]$

$3\sqrt{2} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{18}$

$-2\sqrt{3} = -\sqrt{2^2 \cdot 3} = -\sqrt{12}$

$\frac{1}{2}\sqrt{8} = \sqrt{\frac{1}{2^2} \cdot 8} = \sqrt{\frac{1}{4} \cdot 8} = \sqrt{2}$

$-\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}} = -\sqrt{\frac{2^2}{3^2} \cdot \frac{3}{2}} = -\sqrt{\frac{2}{3}}$

TRASPORTO FUORI DAL SEGNO DI RADICE

Trasporta tutti i fattori possibili fuori dal segno di radice, supponendo che tutte le variabili rappresentino numeri non negativi.

403  $\sqrt{12}$ ;

$\sqrt{50}$

$[2\sqrt{3}; 5\sqrt{2}]$

404  $\sqrt{27}$ ;

$\sqrt{18}$

$[3\sqrt{3}; 3\sqrt{2}]$

405  $\sqrt{200}$ ;

$\sqrt{63}$

$[10\sqrt{2}; 3\sqrt{7}]$

$\sqrt{12} = \sqrt{2 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$

$\sqrt{50} = \sqrt{5^2 \cdot 2} = 5\sqrt{2}$

Lo DIVIDO PER L'INDICE DELLA RADICE

$\sqrt{27} = \sqrt{3^3} = 3\sqrt{3}$

$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$

DIVIDO PER 2:

QUOZIENTE = 1

RESTO = 1

$$\sqrt{200} = \sqrt{5^2 \cdot 2^3} = 5^1 \cdot 2^1 \sqrt{2^1} = 10\sqrt{2}$$

Si come gli esponenti sono  
 $\geq$  dell'indice, entrambi i  
fattori 5 e 2 possono  
essere trasportati fuori

$$\sqrt{10^2 \cdot 2} = 10\sqrt{2}$$

$$\sqrt{63} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = 3\sqrt{7}$$

$$\sqrt[3]{2^8 \cdot 5^2 \cdot 7^6 \cdot 11^{16}} = 2^2 \cdot 7 \cdot 11^5 \cdot \sqrt[3]{2^2 \cdot 5^2 \cdot 11^1}$$

↓  
fatto fuori

↓  
no perché  
 $2 < 3$

↓  
fatto fuori

**411**  $\sqrt{2^8 \cdot 5^5 - 2^{14} \cdot 5^2} =$

[80√61]

$$= \sqrt{2^8 \cdot 5^2 \cdot (5^3 - 2^6)} =$$

$$= 2^4 \cdot 5 \sqrt{5^3 - 2^6} =$$

$$= 80 \sqrt{125 - 64} = 80 \sqrt{61}$$

$$\begin{aligned} x^8 y^5 - x^{14} y^2 &= \\ &= x^8 y^2 (y^3 - x^6) \end{aligned}$$

**413**  $\sqrt{24^2 - 192}; \quad \sqrt{21^2 + 810}$

[8√6; 3√139]

$$\sqrt{24^2 - 192} = \sqrt{(3 \cdot 2^3)^2 - 3 \cdot 2^6} =$$

$$192 \mid 2$$

$$96 \mid 2$$

$$48 \mid 2$$

$$24 \mid 3 \cdot 2^3$$

$$1 \mid$$

$$192 = 3 \cdot 2^6$$

$$= \sqrt{3^2 \cdot 2^6 - 3 \cdot 2^6} = \sqrt{3 \cdot 2^6 (3 - 1)} =$$

$$= \sqrt{3 \cdot 2^6 \cdot 2} = \sqrt{3 \cdot 2^7} = 2^3 \cdot \sqrt{3 \cdot 2}$$

$$= 8\sqrt{6}$$

$$\sqrt{21^2 + 810} = \sqrt{3^2 \cdot 7^2 + 2 \cdot 3^4 \cdot 5} = \sqrt{3^2 (7^2 + 2 \cdot 3^2 \cdot 5)} =$$

$$= 3 \sqrt{49 + 90} = 3 \sqrt{139}$$

420  $\sqrt[3]{5^3 \cdot 7^4}$ ;

$$\sqrt[3]{2^4 \cdot 5^6 \cdot 7^3}$$

$$[35\sqrt[3]{7}; 350\sqrt[3]{2}]$$

$$\sqrt[3]{5^3 \cdot 7^4} = 5 \cdot 7 \sqrt[3]{7} = 35 \sqrt[3]{7}$$

$$\sqrt[3]{2^4 \cdot 5^6 \cdot 7^3} = 2 \cdot 5^2 \cdot 7 \sqrt[3]{2} = 350 \sqrt[3]{2}$$

### SOMME DI RADICALI

459  $2\sqrt{2} + \sqrt{3} - 3\sqrt{2} - 4\sqrt{3} + \sqrt{2}$

$$\cancel{2a} + \underbrace{b} - \cancel{3a} - \underbrace{4b} + \cancel{a} = -3b$$

DEVO SOMMARE I RADICALI SIMILI

$$\cancel{2\sqrt{2}} + \underbrace{\sqrt{3}}_0 - \cancel{3\sqrt{2}} - \underbrace{4\sqrt{3}}_0 + \cancel{\sqrt{2}} = -3\sqrt{3}$$

$$460 \quad \sqrt{8} + \sqrt{2} + \sqrt{27} + \sqrt{12} =$$

$$= \sqrt{2^3} + \sqrt{2} + \sqrt{3^3} + \sqrt{2^2 \cdot 3} =$$

$$= \underbrace{2\sqrt{2}} + \underbrace{\sqrt{2}} + \underbrace{3\sqrt{3}}_0 + \underbrace{2\sqrt{3}}_0 =$$

$$= 3\sqrt{2} + 5\sqrt{3}$$

$$465 \quad \sqrt{18} + \sqrt{12} + \sqrt[6]{27} + \sqrt{2} =$$

$$[4\sqrt{2} + 3\sqrt{3}]$$

$$= \sqrt{3^2 \cdot 2} + \sqrt{2^2 \cdot 3} + \sqrt[2]{\sqrt[3]{3^3}} + \sqrt{2} =$$

$$= \underbrace{3\sqrt{2}} + \underbrace{2\sqrt{3}}_0 + \underbrace{\sqrt{3}}_0 + \underbrace{\sqrt{2}} = 4\sqrt{2} + 3\sqrt{3}$$

$$507 \quad (\sqrt{18} + \sqrt{50}) : \sqrt{2} + (\sqrt{5} + 1)^2 + (\sqrt{5} - 1)(\sqrt{5} + 1) =$$

$$= (\sqrt{3^2 \cdot 2} + \sqrt{5^2 \cdot 2}) : \sqrt{2} + 5 + 2\sqrt{5} + \cancel{1} + 5 - \cancel{1} =$$

$\downarrow \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow$   
 $(\sqrt{5})^2 \quad 2 \cdot \sqrt{5} \cdot 1 \quad 1^2$

$$= (3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}) : \sqrt{2} + 10 + 2\sqrt{5} =$$

$$= \underbrace{\frac{8\sqrt{2}}{\sqrt{2}}}_{8} + 10 + 2\sqrt{5} = 8 + 10 + 2\sqrt{5} = \boxed{18 + 2\sqrt{5}}$$

$$512 \quad (\sqrt{3} - \sqrt{6})^2 - (1 + 2\sqrt{2})^2 + (1 - \sqrt{18})(1 + \sqrt{8}) + \sqrt{800} + 11$$

$$3 + 6 - 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{6} - (1 + (2\sqrt{2})^2 + 4\sqrt{2}) + 1 + \sqrt{8} - \sqrt{18} - \sqrt{18 \cdot 8} + \sqrt{800} + 11 =$$

$$= 9 - 2\sqrt{18} - (1 + 4 \cdot 2 + 4\sqrt{2}) + 1 + \sqrt{2^3} - \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{3 \cdot 2^4} + \sqrt{2^5 \cdot 5^2} + 11 =$$

$$= \cancel{9} - 2 \cdot 3\sqrt{2} - \cancel{1} - \cancel{8} - 4\sqrt{2} + \cancel{1} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} - \cancel{12} + \cancel{11} + 2^2 \cdot 5 \cdot \sqrt{2} =$$

$$= -6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 20\sqrt{2} = \boxed{9\sqrt{2}}$$