

INTRODUZIONE AL CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

Consideriamo un ESPERIMENTO ALEATORIO (es. lancio di una moneta, c.
lancio di un dado
estrazione di una carta)

Ω = SPAZIO CAMPIONARIO, cioè l'insieme
degli esiti dell'esperimento

E = EVENTO, cioè un qualsiasi sottoinsieme di Ω

ES. LANCIO DI UN DADO

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$
$$E_1 = \text{"esce un numero pari"} = \{2, 4, 6\}$$
$$E_2 = \text{"esce un numero primo"} = \{2, 3, 5\}$$
$$E_3 = \text{"esce un numero pari o primo"} = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$
$$E_4 = \text{"esce un numero pari e primo"} = \{2\}$$

notiamo che $E_3 = E_1 \cup E_2$ e $E_4 = E_1 \cap E_2$

$$\begin{array}{c} \uparrow \\ \sigma = V \end{array} \qquad \qquad \qquad \begin{array}{c} \uparrow \\ \tau = \Lambda \end{array}$$

$$E_5 = \text{"esce il numero 7"} = \emptyset \quad \begin{matrix} \text{EVENTO} \\ \text{IMPOSSIBILE} \end{matrix}$$

$$E_6 = \text{"esce un numero compreso
tra 1 e 6"} = \Omega \quad \begin{matrix} \text{EVENTO} \\ \text{CERTO} \end{matrix}$$

$|A|$ = numero degli elementi dell'insieme A , cioè la CARDINALITÀ di A

E_1 = "esce un numero pari"

\bar{E}_1 = "esce un numero dispari"

$$= \Omega \setminus E_1 = \{1, 3, 5\}$$

EVENTO CONTRARIO DI E_1

(è l'insieme complementare di E_1)

DEFINIZIONE | Probabilità classica

Consideriamo un evento E relativo a uno spazio campionario Ω in cui tutti gli eventi elementari hanno la stessa possibilità di verificarsi; supponiamo che l'evento E sia formato da k eventi elementari (brevemente detti «casi favorevoli») e lo spazio campionario Ω sia formato da n eventi elementari (brevemente detti «casi possibili»).

Si definisce probabilità dell'evento E , e si indica con $p(E)$, il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi possibili:

$$p(E) = \frac{k}{n} = \frac{|E|}{|\Omega|}$$

Dato che $|E| \leq |\Omega|$, si ha che $0 \leq p(E) \leq 1$

PROBABILITÀ DELL'EVENTO IMPOSSIBILE $p(\emptyset) = \frac{|\emptyset|}{|\Omega|} = \frac{0}{|\Omega|} = 0$

PROBABILITÀ DELL'EVENTO CERTO $p(\Omega) = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} = 1$

PROBABILITÀ DELL'EVENTO CONTRARIO
DI UN CERTO EVENTO E

$$p(\bar{E}) = \frac{|\bar{E}|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega \setminus E|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega| - |E|}{|\Omega|} = \frac{|\Omega|}{|\Omega|} - \frac{|E|}{|\Omega|} = 1 - p(E)$$

