


- 78 Sia  $ABCD$  un quadrato il cui lato misura  $a$  e  $P$  un punto sul lato  $AB$ . La retta passante per  $P$  e parallela alla diagonale  $AC$  incontra il lato  $BC$  in  $Q$ . Determina la misura di  $AP$  in modo che l'area del pentagono  $APQCD$  sia il triplo dell'area del triangolo  $PQB$ .

$$[\overline{AP} = \frac{a}{2}(2 - \sqrt{2})]$$



$$a > 0$$

$$\overline{AP} = x$$

$$0 < x < a$$

$$\mathcal{A}_{APQCD} = 3 \mathcal{A}_{PQB}$$

$$\mathcal{A}_{APQCD} = \mathcal{A}_{ABCD} - \mathcal{A}_{PBA} = a^2 - \frac{1}{2}(a-x)^2 \quad \mathcal{A}_{PBA} = \frac{1}{2}(a-x)^2$$

$$a^2 - \frac{1}{2}(a-x)^2 = \frac{3}{2}(a-x)^2$$

$$a^2 - 2(a-x)^2 = 0$$

$$a^2 - 2(a^2 + x^2 - 2ax) = 0$$

$$a^2 - 2a^2 - 2x^2 + 4ax = 0$$

$$-2x^2 + 4ax - a^2 = 0$$

$$2x^2 - 4ax + a^2 = 0 \quad \frac{\Delta}{4} = (-2a)^2 - 2a^2 = 2a^2$$

$$\beta = -2a$$

$$x = \frac{2a \pm \sqrt{2a^2}}{2} = \frac{2a \pm a\sqrt{2}}{2} = \frac{a}{2}(2 \pm \sqrt{2})$$

$$= \frac{a}{2}(2 - \sqrt{2}) < a \text{ quindi ok (perché } \frac{2 - \sqrt{2}}{2} < 1)$$

$$= \frac{a}{2}(2 + \sqrt{2}) > a \text{ perche } \frac{2 + \sqrt{2}}{2} > 1$$

NON ACC.

## OSSERVAZIONE IMPORTANISSIMA

$$\sqrt{2a^2} = |a|\sqrt{2}$$

ESEMPIO:  $\sqrt{2 \cdot (-3)^2} = |-3|\sqrt{2}$

$$= 3\sqrt{2}$$

Alla stessa maniera  $\sqrt{x^2} = |x|$

vale per le radici di indice pari:  $\sqrt[4]{x^4} = |x|$