

73

Lo 0,95% delle molecole dell'aria che respiriamo sono di argon. Considera 1,0 m³ di aria in condizioni standard ($p_i = 1,013 \times 10^5$ Pa e $t_i = 20$ °C).

- Calcola il numero di moli di argon presenti nel volume d'aria considerato. [4,0 × 10⁻¹ mol]

$$pV = nRT$$

$$n = \frac{pV}{RT} = \frac{(1,013 \times 10^5 \text{ Pa}) (1,0 \text{ m}^3)}{(8,31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}}) (293 \text{ K})} =$$


\downarrow
moli
di aria

$$= 41,604 \dots \text{ mol}$$

$$n_{Ar} = 0,0095 \cdot n = 0,3952 \dots \text{ mol} = 0,40 \text{ mol}$$

\uparrow
moli di
Argon

- 74** 0,52 moli di un gas perfetto compiono un ciclo formato da due isoterme e due isocore.



Calcola i valori di p , V e T nei quattro stati A , B , C e D .

$$[6,0 \times 10^5 \text{ Pa}; 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3; 4,2 \times 10^2 \text{ K}; 1,8 \times 10^5 \text{ Pa}; 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3; \\ 4,2 \times 10^2 \text{ K}; 1,2 \times 10^5 \text{ Pa}; 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3; 2,8 \times 10^2 \text{ K}; \\ 4,0 \times 10^5 \text{ Pa}; 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3; 2,8 \times 10^2 \text{ K}]$$

STATO A

$$V_A = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$P_A = 6,0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_A = \frac{P_A V_A}{m R} = \frac{(6,0 \times 10^5 \text{ Pa})(3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{(0,52 \text{ mol})(8,31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}})}$$

$$= 416,55 \dots \text{ K} \approx \boxed{4,2 \times 10^2 \text{ K}}$$

STATO B

$$V_B = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad T_B = 4,2 \times 10^2 \text{ K}$$

$$P_B = \frac{m R T_B}{V_B} = \frac{(0,52 \text{ mol})(8,31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}})(416,55 \dots \text{ K})}{10 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = \boxed{1,8 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

STATO D

$$V_D = 3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad P_D = 4,0 \times 10^5 \text{ Pa}$$

$$T_D = \frac{P_D V_D}{m R} = \frac{(4,0 \times 10^5 \text{ Pa})(3,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3)}{(0,52 \text{ mol})(8,31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}})} =$$

$$= 277,70 \dots \text{ K} \approx \boxed{2,8 \times 10^2 \text{ K}}$$

STATO C

$$V_C = 10 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \quad P_C = ? \quad T_C = 2,8 \times 10^2 \text{ K}$$

$$P_C = \frac{m R T_C}{V_C} = \frac{(0,52 \text{ mol})(8,31 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{mol}})(277,70 \dots \text{ K})}{10 \times 10^{-3} \text{ m}^3} = \boxed{1,2 \times 10^5 \text{ Pa}}$$

ORA PROVA TU

Un pallone sonda meteorologico di forma sferica contiene elio alla pressione di 120 kPa e alla temperatura di 293 K.

Il diametro del pallone è di 3,65 m. Quando il pallone sale, la pressione si riduce a 65 kPa mentre la temperatura scende a 253 K.

► Qual è la variazione percentuale di volume del pallone?

[59%]

$$\frac{\Delta V}{V_{\text{ini.}}} = \frac{V_{\text{fin.}} - V_{\text{ini.}}}{V_{\text{ini.}}} = \frac{V_{\text{fin.}}}{V_{\text{ini.}}} - 1$$

$$\frac{P_{\text{fin.}} V_{\text{fin.}}}{T_{\text{fin.}}} = \frac{P_{\text{ini.}} V_{\text{ini.}}}{T_{\text{ini.}}} \Rightarrow V_{\text{fin.}} = \frac{P_{\text{ini.}} V_{\text{ini.}}}{T_{\text{ini.}}} \cdot \frac{T_{\text{fin.}}}{P_{\text{fin.}}}$$

↓↓

$$\frac{V_{\text{fin.}}}{V_{\text{ini.}}} = \frac{P_{\text{ini.}} T_{\text{fin.}}}{T_{\text{ini.}} P_{\text{fin.}}}$$

$$\frac{\Delta V}{V_{\text{ini.}}} = \frac{P_{\text{ini.}} T_{\text{fin.}}}{T_{\text{ini.}} P_{\text{fin.}}} - 1 = \frac{(120 \text{ kPa})(253 \text{ K})}{(293 \text{ K})(65 \text{ kPa})} - 1 =$$

$$= 0,59411\dots \simeq \boxed{59 \%}$$