

29

$$\frac{3^x - 2}{2} + \frac{9^x - \frac{1}{2}}{3^x} + 2 > 0$$

$$[x > -1]$$

$$t = 3^x$$

$$\frac{t-2}{2} + \frac{t^2 - \frac{1}{2}}{t} + 2 > 0$$

$$\frac{t(t-2) + 2t^2 - 1 + 4t}{2t} > 0$$

$$\frac{t^2 - 2t + 2t^2 - 1 + 4t}{2t} > 0$$

$$\frac{3t^2 + 2t - 1}{2t} > 0$$

\nearrow perché $t = 3^x > 0 \forall x$

$$3t^2 + 2t - 1 > 0$$

$$\Delta = 1 + 3 = 4$$

$$t = \frac{-1 \pm 2}{3} = \begin{cases} -1 \\ \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$t < -1 \vee t > \frac{1}{3}$$

$$3^x < -1 \quad \text{IMPOSS.} \quad \vee \quad 3^x > \frac{1}{3}$$

$$3^x > 3^{-1}$$


↓
 $x > -1$

Se non avessi semplificato il denominatore

$$\boxed{N} \quad \frac{3t^2 + 2t - 1}{2t} > 0$$

$$\boxed{N} \quad 3t^2 + 2t - 1 > 0 \quad t < -1 \vee t > \frac{1}{3}$$

$$\boxed{D} \quad t > 0$$



$$-1 < t < 0 \quad \vee \quad t > \frac{1}{3}$$



$$-1 < 3^x < 0 \quad \vee \quad 3^x > \frac{1}{3}$$

IMPOSSIBILE

$$\boxed{x > -1}$$

313

$$\frac{1}{9^x + 3^{2x}} > \frac{3}{2}$$

$$\left[x < -\frac{1}{3} \right]$$

$$t = 3^x$$

$$\frac{t^{-1}}{t^2 + t^2} > \frac{3}{2} \quad \rightsquigarrow \quad \frac{1}{t} \cdot \frac{1}{2t^2} > \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2t^3} > \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{t^3} > 3 \quad \Rightarrow \quad t^3 < \frac{1}{3} \quad \text{perihe } t > 0$$

$$(3^x)^3 < 3^{-1}$$

$$3^{3x} < 3^{-1}$$

$$3x < -1$$

$$\boxed{x < -\frac{1}{3}}$$

285

Determina l'equazione di un'ellisse, con centro nell'origine e i fuochi sull'asse x , che ha eccentricità $\frac{\sqrt{3}}{2}$ e passa per il punto $P(-4; -\sqrt{5})$. Calcola l'area del triangolo ABC inscritto nell'ellisse, sapendo che i punti A e B hanno la stessa ascissa del fuoco che si trova sul semiasse positivo delle x e C è il vertice dell'ellisse sul semiasse negativo delle x .

$$\left[x^2 + 4y^2 = 36; \frac{9}{2}(2 + \sqrt{3}) \right]$$

$$P(-4, -\sqrt{5})$$

$$e = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{c}{a} \quad \text{perché i fuochi su asse } x$$

$$c = \frac{\sqrt{3}}{2} a \quad b^2 = a^2 - c^2 =$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$= a^2 - \frac{3}{4} a^2 = \frac{1}{4} a^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{\frac{1}{4} a^2} = 1$$


$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{4y^2}{a^2} = 1$$

$$x^2 + 4y^2 = a^2$$

$$\text{pongo } x = -4, y = -\sqrt{5} \Rightarrow 16 + 4 \cdot 5 = a^2$$

$$a^2 = 36$$

$$\boxed{\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1}$$



$$F_2(c, 0)$$

$$c^2 = a^2 - b^2 = 36 - 9 = 27 \quad c = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$x = 3\sqrt{3} \rightarrow \frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \frac{\frac{27}{4}}{36} + \frac{y^2}{9} = 1 \quad \frac{y^2}{9} = 1 - \frac{3}{4}$$

$$\frac{y^2}{9} = \frac{1}{4} \quad y = \pm \frac{3}{2}$$

$$\overline{AB} = \frac{3}{2} \cdot 2 = 3$$

$$\overline{CF_2} = 6 + 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot (6 + 3\sqrt{3}) = \boxed{\frac{9}{2}(2 + \sqrt{3})}$$

287

Determina l'equazione di un'ellisse con centro nell'origine e i fuochi sull'asse x , che ha la somma delle misure degli assi che vale 6 e l'eccentricità uguale a $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Trova quindi l'equazione della tangente nel suo punto di ascissa $\sqrt{3}$ del primo quadrante.

$$\left[\frac{x^2}{4} + y^2 = 1; y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + 2 \right]$$

$$2a + 2b = 6$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$b^2 = a^2 - c^2 =$$

⇓

$$c = \frac{\sqrt{3}}{2}a$$

$$= a^2 - \frac{3}{4}a^2 = \frac{1}{4}a^2$$

$$\begin{cases} a + b = 3 \\ b^2 = \frac{1}{4}a^2 \end{cases} \quad \begin{cases} a + \frac{1}{2}a = 3 \\ b = \frac{1}{2}a \end{cases} \quad \begin{cases} \frac{3}{2}a = 3 \\ b = \frac{1}{2}a \end{cases} \quad \begin{cases} a = 2 \\ b = 1 \end{cases}$$

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$$

$$\begin{cases} x = \sqrt{3} \\ \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ \frac{3}{4} + y^2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y^2 = 1 - \frac{3}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y^2 = \frac{1}{4} \end{cases} \quad \begin{cases} x = \sqrt{3} \\ y = \pm \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow P(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$$

considera
soluz. +
perché I QUADR.

$$\begin{cases} y - \frac{1}{2} = m(x - \sqrt{3}) \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} y = mx - \sqrt{3}m + \frac{1}{2} \\ x^2 + 4(mx - \sqrt{3}m + \frac{1}{2})^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

$$x^2 + 4(m^2x^2 + 3m^2 + \frac{1}{4} - 2\sqrt{3}m^2x + mx - \sqrt{3}m) - 4 = 0$$

$$x^2 + 4m^2x^2 + 12m^2 + 1 - 8\sqrt{3}m^2x + 4mx - 4\sqrt{3}m - 4 = 0$$

$$(1 + 4m^2)x^2 - 2(4\sqrt{3}m^2 - 2m)x + 12m^2 - 4\sqrt{3}m - 3 = 0$$

$$(1+4m^2)x^2 - 2(4\sqrt{3}m^2 - 2m)x + 12m^2 - 4\sqrt{3}m - 3 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 0$$

$$(4\sqrt{3}m^2 - 2m)^2 - (1+4m^2)(12m^2 - 4\sqrt{3}m - 3) = 0$$

$$48m^4 + 4m^2 - 16\sqrt{3}m^3 - \cancel{(12m^2 - 4\sqrt{3}m - 3)} + \cancel{48m^4 - 16\sqrt{3}m^3 - 12m^2} = 0$$

$$4m^2 + 4\sqrt{3}m + 3 = 0$$

$$\frac{\Delta}{4} = 12 - 12 = 0 \quad (2m + \sqrt{3})^2 = 0$$

$$2m + \sqrt{3} = 0$$

$$m = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$y - \frac{1}{2} = m(x - \sqrt{3}) \Rightarrow y - \frac{1}{2} = -\frac{\sqrt{3}}{2}(x - \sqrt{3})$$

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + 2$$