

Trova l'area del segmento parabolico individuato dalla parabola di equazione  $y = x^2 - 4x$  e dalla retta  $y = 2x$ . [36]

$$\begin{cases} y = x^2 - 4x \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 4x = 0 \quad x(x-4) = 0 \\ x=0 \vee x=4$$

A

$$\begin{cases} y = 2x \\ y = x^2 - 4x \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 4x = 2x \\ y = 2x \end{cases} \quad \begin{cases} x^2 - 6x = 0 \\ y = 2x \end{cases}$$

$$\begin{cases} x(x-6) = 0 \\ y = 2x \end{cases} \quad \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases} \quad O(0,0) \quad \begin{cases} x = 6 \\ y = 12 \end{cases} \quad A(6,12)$$

$$\begin{cases} y = 2x + K \\ y = x^2 - 4x \end{cases} \quad \begin{matrix} x^2 - 4x = 2x + K \\ x^2 - 6x - K = 0 \end{matrix}$$

PONGO

$$\frac{\Delta}{4} = 0$$

↓

$$g + K = 0 \quad K = -g$$

retta tangente  $y = 2x - g$ 


$$\begin{cases} y = 2x - g \\ y = x^2 - 4x \end{cases} \quad \begin{matrix} x^2 - 4x = 2x - g \\ x^2 - 6x + g = 0 \end{matrix}$$

$$(x-3)^2 = 0 \Rightarrow x = 3$$

$$y = 2 \cdot 3 - g = -3$$

T(3, -3) PUNTO DI TANGENZA

O(0,0) A(6,12) T(3,-3)



$$= -18 - (36) = -54$$

TRIANGOLO

$$A_{OAT} = \frac{1}{2} |-54| = 27$$

$$A_{\text{SEGK. PAR.}} = \frac{4}{3} \cdot 27^3 = 36$$

361

Una parabola, con l'asse parallelo all'asse  $y$ , ha vertice  $V(4; 2)$  e passa per il punto di intersezione delle rette di equazioni  $5x - 2y - 10 = 0$  e  $3x + 2y + 2 = 0$ . Determina la sua equazione.

$$\left[ y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 6 \right]$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$V(4, 2)$$

PASSAGGIO PER P

$$\begin{cases} -\frac{b}{2a} = 4 \\ -\frac{\Delta}{4a} = 2 \\ -\frac{5}{2} = a + b + c \end{cases}$$

PUNTO DI INT. DELLE RETTE

$$\begin{cases} 5x - 2y - 10 = 0 \\ 3x + 2y + 2 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\frac{8x - 8 = 0}{8x - 8 = 0}$$

$$P(1, -\frac{5}{2})$$

$$\begin{cases} b = -8a \\ \Delta = -8a \\ a - 8a + c = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} // \\ 64a^2 - 4ac = -8a \\ -7a + c = -\frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} // \\ 16a - c = -2 \\ c = 7a - \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$16a - 7a + \frac{5}{2} = -2$$

$$9a = -\frac{5}{2} - 2$$

$$9a = -\frac{9}{2}$$

$$\begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -8 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 4 \\ c = -\frac{7}{2} - \frac{5}{2} = -6 \end{cases}$$

$$y = -\frac{1}{2}x^2 + 4x - 6$$

SISTEMA ALTERNATIVO (CONSIDERO IL VERTICE COME PUNTO DI PASSAGGIO)

$$V(4, 2) \quad \begin{cases} -\frac{b}{2a} = 4 \end{cases}$$

$$P(1, -\frac{5}{2}) \quad \begin{cases} 2 = 16a + 4b + c \\ -\frac{5}{2} = a + b + c \end{cases}$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

questo sistema è equivalente  
al precedente (ha le stesse soluzioni)

367

Scrivi l'equazione della parabola  $y = ax^2 + bx + c$  passante per i punti  $A(2; 0)$ ,  $B(1; -1)$  e tangente alla retta di equazione  $y = -2x + 5$ .

$$[y = -x^2 + 4x - 4; y = -9x^2 + 28x - 20]$$

$$y = ax^2 + bx + c$$

$$\begin{array}{l} A(2, 0) \\ B(1, -1) \end{array} \quad \left\{ \begin{array}{l} 0 = 4a + 2b + c \\ -1 = a + b + c \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} c = -4a - 2b \\ -1 = a + b - 4a - 2b \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} c = -4a - 2(1 - 3a) = -4a - 2 + 6a = 2a - 2 \\ b = 1 - 3a \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y = ax^2 + (1 - 3a)x + (2a - 2) \\ y = -2x + 5 \end{array} \right.$$

$$ax^2 + (1 - 3a)x + (2a - 2) = -2x + 5$$

$$ax^2 + (1 - 3a)x + (2a - 2) + 2x - 5 = 0$$

$$ax^2 + (1 - 3a + 2)x + (2a - 2 - 5) = 0$$

$$ax^2 + (3 - 3a)x + (2a - 7) = 0$$

Cond. TANGENZA

$$\Delta = 0$$

$$(3 - 3a)^2 - 4a(2a - 7) = 0$$

$$9 + 9a^2 - 18a - 8a^2 + 28a = 0$$

$$a^2 + 10a + 9 = 0 \quad (a + 9)(a + 1) = 0$$

$$\begin{cases} a = -9 \\ b = 1 + 3(-9) = 28 \\ c = 2(-9) - 2 = -20 \end{cases}$$

$$\vee \begin{cases} a = -1 \\ b = 1 + 3 = 4 \\ c = -4 \end{cases}$$

$y = -9x^2 + 28x - 20$
$y = -x^2 + 4x - 4$